复方丹参注射液合半夏白术天麻汤治疗急性眩晕疗效观察

肖新李

(广东省河源市中医院 河源 517000)

关键词:眩晕;复方丹参注射液;半夏白术天麻汤;急症

中图分类号:R255.3

文献标识码:B

文章编号:1671-4040(2003)02-0014-01

急性眩晕是急诊常见病之一,以头晕目眩、视物旋转如坐车船,甚至仆倒为主要特征。笔者自 2001 年 3 月~2002 年 9 月将 83 例急性眩晕患者随机分为复方丹参注射液合半夏白术天麻汤组(治疗组)和维脑路通组(对照组)进行临床疗效观察,现报道如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 83 例均为急诊收入住院患者,按照随机数字表法随机分为治疗组和对照组。治疗组 43 例,男 18 例,女 25 例;年龄最小 19 岁,最大 67 岁;病程最短 25min,最长 22h。对照组 40 例,男 16 例,女 24 例;年龄最小 20 岁,最大 70 岁;病程最短 30min,最长 20h。

1.2 病例选择 诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》制定。均为初次发作或既往有眩晕病史,急性发作病程 24h 内。症见突发头晕目眩、视物旋转、或如坐车船,甚则仆倒,可伴有恶心呕吐、眼球震颤、耳鸣耳聋、汗出、面色苍白等,可作心电图、测血压、颈椎 X 光片、CT 等协助诊断。凡有以下条件之一的患者需排除:发作时间超过 24h 者;妊娠和哺乳期妇女有肝肾疾病、糖尿病、大出血、脑肿瘤、严重血液病等及有外伤者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 取复方丹参注射液 20mL 加入 5%GS 250mL 静脉滴注,每天 1 次,连用 3d;半夏白术天麻汤加味,每天 1 剂,连服 3d。药物组成:半夏 10g,天麻 6g,茯苓 12g,橘红 6g,白术 15g,龙骨(先煎) 30g,珍珠母(先煎) 30g,僵蚕 9g,守宫 2 条,甘草 5g。

2.2 对照组 维脑路通注射液 0.4~0.6g 加入 5%GS 250 mL 静脉滴注,每天 1 次,连用 3d。

3 疗效观察

3.1 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》制定。治愈:症状、体征及有关实验室检查基本正常。有效:症状及体征减轻,实验室检查改善。无效:症状无改善。

3.2 治疗结果 治疗组 43 例中,治愈 35 例,有效 6 例,无效 2 例,总有效率为 95.47%;对照组治愈 15 例,有效 12 例,无效 13 例,总有效率为 67.5%。2 组疗效经统计学分析, $\chi^2=12.01, P<0.01$,2 组比较差异有非常显著性意义,治疗组疗效优于对照组。

4 体会

急性眩晕是以突发头晕眼花,甚至昏倒,并伴有恶心、呕吐、耳鸣、汗出为主症。其病位虽在头,但病因涉及三焦,在上焦多属风痰为患;在中焦多为清阳不升,浊阴不降;在下焦者则多为肝肾虚证。本病多属本虚标实之证,肝肾阴虚、气血不足为病之本,痰、瘀、风、火为病之标。现代医学的眩晕主要包括梅尼埃病、椎基底动脉供血不足、颈椎病、晕动症等。按中医急则治其标、缓则治其本的治疗原则,眩晕急性发作时治标为主,以活血祛瘀、燥湿化痰、平肝熄风为主立法。选用复方丹参注射液合半夏白术天麻汤加味。复方丹参注射液为丹参、降香提取液制成的灭菌水溶液,为临床有效的活血化瘀药物之一。丹参有祛瘀止痛、活血调经、除烦安神的作用,主要含有丹参酮 I、II A、II B、III,隐丹参酮,异丹参酮 I、II,丹参新酮,丹参醇及维生素 E 等。药理研究表明,本品有扩张血管、降血压、改善微循环、镇痛及降血脂、降低粘稠度等作用。降香有化瘀止血、理气止痛的作用,主要含黄檀素、异黄檀素等,有抗凝、扩张冠脉等作用。降香、丹参合用有增强扩张血管、改善微循环、镇静、镇痛等功能。半夏白术天麻汤有燥湿化痰、平肝熄风功效,龙骨、珍珠母加强平肝潜阳、镇静安神作用僵蚕、守宫通络化痰,对神经功能的恢复有一定的促进作用。本组观察表明,复方丹参注射液合半夏白术天麻汤治疗组疗效优于维脑路通对照组,说明复方丹参注射液治疗急性眩晕与扩张血管、改善微循环,以及半夏白术天麻汤燥湿化痰降浊、平肝熄风有关,具有一定的临床推广价值。

(收稿日期:2003 - 01 - 23)

* 欢迎征订! 欢迎规范化、实用性文稿! 欢迎刊登广告! *