

酚妥拉明足三里注射治疗产后尿潴留疗效观察

杨宏伟¹ 赵春霞¹ 栾艳秋²

(1 黑龙江省大庆市第四医院 大庆 163712; 2 北京市东四妇产医院 北京 100007)

关键词: 产后尿潴留; 水针疗法; 酚妥拉明; 足三里

中图分类号: R 714.46 文献标识码: B 文章编号: 1671-4040(2003)02-0027-01

产后尿潴留是产后常见的并发症之一, 我科采用酚妥拉明双侧足三里注射治疗产后尿潴留取得满意疗效。现报道如下:

1 一般资料 1998 年 1 月~2000 年 12 月在我院住院经阴道分娩产妇 1 657 例, 发生尿潴留 47 例, 发生率为 2.8%, 随机分研究组 24 例, 对照组 23 例, 分别观察 24h 排尿情况。

2 方法 凡产后 6h 不排尿, 经检查膀胱充盈, 有尿意感, 诱导排尿无效, 可诊断为尿潴留。研究组给予酚妥拉明 100mg, 两侧足三里注射; 对照组给予新斯的明 1mg, 两侧足三里注射。分别于注射后 15、30、60min 嘱患者排尿。若 2h 仍不能排尿者, 重复 1 次, 方法及剂量同上, 酚妥拉明最大剂量 30mg, 新斯的明最大剂量 3mg, 记录排尿情况, 结果采用统计学处理, χ^2 检验。

3 结果 研究组 5min 排尿 15 例, 30min 排尿 7

例, 60min 排尿 2 例, 120min 排尿 0 例; 对照组分别为 3、10、9、1 例。2 组间比较, 差异显著, $P < 0.01$ 。2 组用药后, 研究组阴道流血略增加 1 例, 无改变 23 例, 血压下降 3 例, 无变化 21 例; 对照组分别为 1、22、1、22 例。2 组用药后阴道出血量、血压变化比较均差异不显著, $P > 0.05$ 。

4 讨论 产后尿潴留原因: 产程中由于先露部的压迫, 使膀胱粘膜水肿, 感受功能失调, 排尿反射不能进行; 产后由于伤口和尿道周围组织损伤性疼痛刺激尿道括约肌发生痉挛。酚妥拉明可以改善微循环, 减轻粘膜水肿, 帮助膀胱肌恢复张力, 促使排尿反射形成, 解除尿道括约肌的痉挛而引起排尿。足三里是针灸学中治疗尿潴留的穴位之一, 采用酚妥拉明双侧足三里注射治疗产后尿潴留, 中西医结合, 优势互补, 故疗效相加。

(收稿日期: 2002-10-21)

吴茱萸贴脐促进腹部手术后胃肠功能恢复 38 例疗效观察

谭晓红

(湖北省远安县中医院外科 远安 444200)

关键词: 术后; 胃肠功能紊乱; 敷脐疗法; 吴茱萸

中图分类号: R574.4

文献标识码: B

文章编号: 1671-4040(2003)02-0029-02

腹部手术, 特别是消化道手术后胃肠功能的恢复, 直接影响腹部手术的治疗效果。笔者自 2001 年 8 月~2002 年 10 月采用中药吴茱萸贴脐治疗腹部手术病人 38 例以促进胃肠功能的恢复收效尚为满意。现整理如下:

1 临床资料

本组资料均为我科住院手术病人, 其中阑尾炎手术 30 例, 胃大部切除术 4 例, 胆囊切除及胆总管切开探查术 22 例, 肠粘连松解术及小肠外伤破裂修补术各 10 例。均采用持续硬膜外麻醉, 随机抽样将病人分为治疗组和对照组。其中对照组 38 例, 男 23 例, 女 15 例; 年龄 5~65 岁, 平均年龄为 30.5 岁。治疗组 38 例, 男 20 例, 女 18 例; 年龄 5~71 岁, 平

均年龄 30.1 岁。2 组病人在病种、年龄、性别及手术时间上经统计学处理无显著性差异, 具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照组 术后常规抗炎、止痛、止血、支持及对症治疗。

2.2 治疗组 在对照组的基础上加用吴茱萸米醋糊贴脐。方法是: 取吴茱萸 10g, 研为细末, 加米醋适量调为稀糊状, 在手术后 30min 内贴敷于肚脐孔处, 外用敷料盖住并以胶布固定, 每 12 h 换药 1 次, 连续 3 次。

3 疗效观察

3.1 疗效标准 显效: 治疗后 12 h 内腹中肠鸣音出现, 肛门排气。有效: 治疗后 24 h 内腹中肠鸣音出