

中西医结合治疗女阴尖锐湿疣 48 例疗效观察

张秀荣

(陕西省商南县城关中心卫生院 商南 726300)

关键词:尖锐湿疣;女阴;中西医结合疗法;尤沙星;消疣熏洗方

中图分类号:R 752.53

文献标识码:B

文章编号:1671-4040(2003)04-0023-01

自 2001 年 5 月~2002 年 5 月对 48 例女阴尖锐湿疣的诊断通过外阴醋酸白试验均符合卫生部 2000 年 7 月制订的《性病诊断标准和处理原则》中尖锐湿疣的诊断标准,采用陕西咸阳高科药物研究所生产的尤沙星局部涂沫及中药浓缩液熏洗治疗取得了满意效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组年龄 18~40 岁,平均年龄 29 岁。48 例中美容美发员 20 例,路边店员 18 例,卖血清(浆)后将红血球回输体内 3 例,配偶司机者 7 例;病程最短 1 周,最长 2 年,平均 1 年;好发阴唇及阴道口 22 例,宫颈及阴道壁 8 例,肛周 6 例,会阴及肛周同患 12 例;皮损由单个至数十个,皮损面积为 0.1~5cm,患者常有外阴瘙痒,同时并有不同程度的白带增多,无明显的疼痛,破溃时有可能引起少量出血,病情较轻者,尖锐湿疣呈点状分布,重者融合鸡冠状或菜花生长。

1.2 治疗方法 常规用 1/1 000 新洁尔灭局部消毒外阴和阴道,充分暴露病灶处,用干棉球擦净分泌物之后,用纱布条或药棉保护好正常组织,再用干棉花棒将尤沙星药液均匀涂病灶处,每日 3 次,共用 3~7d,涂药后暴露患处约 3~5min,使药液渗透干燥。再用中药消疣熏洗方:灵磁石(先煎)、苦参、板蓝根、土茯苓各 30g,黄柏、苍术、紫草、木贼、蜂房各 15g。1d 1 剂,加水 3 000mL 浓煎成 300mL,先熏后洗,早、晚各 1 次,每次 30min,10d 为 1 个疗程,连用 2~3 个疗程。

2 治疗结果

所有病例都在门诊治疗。阴道粘膜病例用药 3d,皮肤病例用药 4~5d 后病灶处赘生物开始坏死脱落,同时病灶周围有轻微的潮红炎症反应,表面坏死物脱落后粘膜或皮肤表面呈红色颗粒状,继续用药 3~6 次(局部突出物从根部消失,恢复平坦,有强性光泽)。其中阴道及宫颈粘膜病例 8 例、皮肤病例小的 5d 治愈,大的尖锐湿疣 7d 治愈。本方法的主要副作用为局部较大赘生物脱落后创面有些疼痛,其程度可忍受,无需特殊处理,其中有 1 例赘

生物较大在 3.5cm 脱落后创面较大痛疼难忍,在涂药前给利多卡因局部创面涂抹麻醉后,再用尤沙星药涂沫并压病灶处病人才无疼痛感觉。

3 典型病例

黄某,38 岁,3 个月前因外阴瘙痒,来我院行妇科检查,阴道白带呈凝乳豆腐渣状,经镜检诊断为霉菌性阴道炎,给达克宁栓阴道放置,10d 为 1 个疗程,共用 3 个疗程后,外阴瘙痒症状消失。3 个月后,又觉肛周瘙痒不适,用手去搔抓时发现肛门周围有 2 个小疙瘩并逐渐增大,而且向会阴部长出数个米粒大小的暗灰色赘生物。经来院检查,肛门粘膜 7 点及 6 点处各长一个约 1.5~2.5cm 大小鸡冠样的赘生物,会阴部有 5 个高出皮肤约 0.1、0.2、0.3、0.4cm 不等的暗灰色菜花状,白带镜检阴性。诊断为“会阴及肛周尖锐湿疣”。用干棉棒蘸尤沙星药液涂沫并压患处 1~2min,每日 3 次,再用中药消疣熏洗方治疗。用以上方法治疗至第 3 天时病变组织呈灰白色并萎缩变小,第 4 天开始脱落,第 6 天赘生物基本脱落完,继续涂压 2~3d,局部组织恢复平坦,4 个月后复查未见异常。

4 讨论

尤沙星是从植物鸡苔素中提取,结合瑞典默克公司的“疣敌”原料,运用现代高科技组方而成,其有效成份是杀灭人乳头瘤病毒(HPV)的有效药物。药理试验表明,本品能有效抑制细胞的有丝分裂,可直接渗透入深层皮肤细胞,直接杀死皮下的人乳头瘤病毒,从而达到治疗尖锐湿疣的目的。中药熏洗疗法,发挥中药益气养阴扶正、清热解毒利湿、活血化痰散结的作用,局部浸泡渗透,直达病所,改善局部环境,增强局部免疫力,祛毒抑菌消疣,有效降低尖锐湿疣复发率。1 年来经我们采用尤沙星局部涂沫及中药浓煎液先熏后洗治愈 48 例,治愈率 100%,随访 3~6 个月无 1 例复发。此法局部损伤小,不易合并感染,愈合后不留疤痕,而且简便,不受医疗条件限制,故在基层医疗单位更适宜,值得推广应用。

(收稿日期:2003-03-11)