

悦安欣治疗脑梗死 96 例临床观察

何冰¹ 刘新稳²

(1 山东省郓城县中医院 郓城 274700 ; 2 山东省郓城县李集乡卫生院 郓城 274700)

关键词 脑梗死 悦安欣注射液 临床观察

中图分类号 R 743.3

文献标识码 B

文献编号: 1671-4040(2004)02-0038-01

脑血管发病急,后遗症多,为探讨治疗缺血性脑血管病的有效治疗药物,笔者应用悦安欣注射液治疗脑梗死 96 例,已取较好疗效。现报告如下:

1 一般资料

96 例人均经头颅 CT 证实为脑梗死,符合全国第 2 届脑血管病学术会议通过的诊断标准,其中男女之比 3 : 2;年龄均在 45~80 岁之间;发病时间最短的 6 h,最长的 7d;初次发病的 64 例,2 次复发的 32 例;神志不清者 18 例,语言不清伴肌力障碍者 35 例,记忆力减退者 20 例,肌力障碍者 23 例。

2 治疗方法

均应用沈阳双鼎制药有限公司的悦安欣注射液 20mL 加入 0.9%生理盐水中静滴,日 1 次,7d 为 1 个疗程,其间有颅内压高者给予 20%甘露醇降颅压,血压高者应用 CPT 配合营养支持疗法,不用其他血管活性药物。

3 疗效观察

显效(肌力提高 2~3 级,语言、神志、记忆力明显改善)69 例,有效(肌力提高 I 级,语言、神志、记忆力改善)21 例,无效 6 例,总有效率 94%;用药后血、尿、大便及肝、肾功能与电解质检查均无明显副作用。

4 讨论

脑梗死是由于脑组织的局部动脉血流灌注减少或突然血流中断,停止供血养而引起该供血区的组织缺血坏死、软化。据药理研究证明,悦安欣注射液能清除血液中的自由基,明显抑制血小板聚集,增加纤维蛋白质溶解酶活性,降低血液粘度,致使血流加速和毛细血管网开放增多,改善微循环,进而增加血栓溶解及脑血流量,以利于脑组织的恢复,促进病情好转与恢复。

(收稿日期:2003 - 12 - 02)

三子养亲汤合定喘汤治疗喘息型慢性支气管炎 32 例

周长恒 张广梅

(山东省肥城市湖屯镇卫生院 肥城 271613)

关键词 三子养亲汤 定喘汤 老年人 喘息型慢性支气管炎

中图分类号 R 562.2*1

文献标识码 B

文献编号: 1671-4040(2004)02-0038-02

三子养亲汤见于《韩氏医通》,本方原为气实痰盛之证而设。定喘汤见于《摄生众妙方》,为治疗风寒外表、痰热内蕴之哮喘咳嗽之方。笔者自 1993 年以来运用此两方合用治疗老年人喘息型慢性支气管炎 32 例,疗效显著。现总结如下:

1 一般资料

本组 32 例均系我院住院病人,其中男性 21 例,女性 11 例;年龄最大者 78 岁,最小者 55 岁;病程最长者 50 年,最短者 5 年;单纯慢性支气管炎者 28 例,合并有肺心病、肺气肿者 4 例。诊断标准符合《内科学》第 4 版慢性支气管炎诊断标准:咳嗽、咳痰或伴气喘,每年发病持续 3 个月,连续 2 年或以上,并排除其他心肺疾患;或每年发病持续不足 3 个月而有明显的 X 线依据。

2 治疗方法

2.1 基本方组成 炒苏子 10g,炒白芥子 10g,炒莱菔子

10g,炙麻黄 6g,炒白果 10g,黄芩 10g,半夏 10g,炒杏仁 10g,款冬花 10g,桑白皮 10g,丹参 15g,金银花 30g,炙甘草 5g。加减:伴发热、多汗者,去麻黄,加生石膏、知母;便秘者,加瓜蒌、生大黄;气虚者,加黄芪、党参;肾不纳气者,加胡桃仁、蛤蚧;阴虚者,加山茱萸、枸杞子。

2.2 煎服方法 冷水浸泡 40~60min,早、晚 2 次分煎,煎取 300mL,每次 150mL,14d 为 1 个疗程。

3 疗效观察

显效(咳嗽、咳痰、呼吸困难、喉中痰鸣、肺部罗音基本消失)18 例,有效(咳嗽、咳痰、呼吸困难明显减轻、喉中痰鸣消失、肺部罗音明显减少)11 例,无效(症状、体征无改善或无明显改善)3 例,总有效率 90.6%。

4 典型病例

李某,男,78 岁,2003 年 1 月 13 日入院。患者患有慢性支气管炎病史 40 余年,咳嗽、咳痰反复发作,气喘痰鸣,年均