

中西药治疗宫颈糜烂效果观察与分析

周永琴

(陕西省平利县医院 平利 725500)

关键词:宫颈糜烂 中西医结合疗法 云南白药 麝香 红霉素

中图分类号 R 711.32

文献标识码 B

文献编号: 1671-4040(2004)02-0047-01

我们自 2001~2003 年 9 月, 中西医结合对 100 例 I、II 度宫颈糜烂进行观察。

1 材料与方法

患者系城区职工及菜农, 23~50 岁已婚妇女, 按郑怀美主编《妇产科学》第 3 版的诊断标准, 确定 I、II、III 度宫颈糜烂。方法: 以云南白药 3 瓶加麝香 2g, 月经干净第 2 日上药, 隔日 1 次, 10 次为 1 个疗程。用双氧水清洗糜烂面, 在带线消毒棉球上撒上药粉, 塞入宫颈糜烂区, 24h 自行拉线取出, 放药头 5d 口服红霉素 0.5g, 每日 3 次, 连服 3d。

2 结果

临床症状改善见表 1。

表 1 临床疗效分析					例
临床症状	例数	消失	减轻	不变	有效率(%)
白带增多	92	25	55	12	86.96
腰腹痛	83	45	32	6	92.76
腹坠	50	30	15	5	90.00

I 度宫颈糜烂药物疗效显著, 治疗 2 个疗程的治愈率达 83%, 治疗 1 个疗程的治愈率达 50%, 总的治愈率 67%; 2 个疗程与 1 个疗程相比, 差别较大, 但药物效果对 I 度较好, 治愈率高。II 度宫颈糜

烂效果观察, 比较 2 个疗程和 1 个疗程治愈率差别不太显著, 2 个疗程治愈率为 73.08%, 1 个疗程治愈率为 83.33%, 总的治愈率为 78%, 由此可见 II 度以上宫颈糜烂 2 个疗程以上能达到满意的效果。

3 讨论

云南白药、麝香、红霉素、双氧水对厌氧菌敏感, 其作用机制为抗炎, 消水肿, 改善微循环, 具有生肌、调节细胞功能产生抗体、增强自身免疫功能的作用, 云南白药加麝香, 作用时间长, 对细菌、病毒有抑制杀死功能, 副作用小。红霉素杀菌抑菌, 对淋球菌、梅毒螺旋体有较强杀灭力, 但易产生耐药性。中西药综合治疗有协同作用, 从而获得较好疗效。

直接将药物涂糜烂面, 使药物最大限度地发挥作用, I 度治愈率 83.33%, II 度治疗率为 78.00%, 与其它文献报道相近^[1], 但少数患者有红霉素的胃部刺激症状, 口服等量碳酸氢钠后症状消失。

参考文献

[1] 宋杨, 陈敬平. 干扰素栓治疗宫颈糜烂 112 例疗效观察[J]. 实用妇产科杂志, 2001, 17(1): 33

(收稿日期: 2004 - 01 - 02)

泰能致肠道二重感染 9 例临床分析

王君磊 姜文

(山东省济宁市市中区人民医院 济宁 272005)

关键词: 宫颈糜烂 中西医结合疗法 云南白药 麝香 红霉素

中图分类号 R 711.32

文献标识码 B

文献编号: 1671-4040(2004)02-0047-02

泰能是 β -内酰胺类超广谱高效能抗生素, 在许多危重感染救治中起到良好的救治效果。在临床应用, 我们发现泰能容易引起肠道二重感染, 现报告如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 1999 年 9 月~2003 年 9 月, 我们应用泰能[美国默克公司生产, 批号(97)卫药准字

号 T-61(2)号]治疗各种危重感染患者, 其中 9 例在用药后发生腹泻, 送检大便常规证实为肠道菌群失调, 继发念珠菌肠炎, 其中男 6 例, 女 3 例; 年龄 35~85 岁, 平均 65.5 岁; 原发病重型颅脑外伤合并肺部感染 3 例, 胆系肿瘤术后腹部感染 2 例, 肺性脑病 2 例, 重症胰腺炎 1 例, 原发性败血症 1 例。9 例患者治疗原发感染时泰能治疗方案为每次 1g, 每