

● 诊治经验 ●

步长稳心颗粒治疗阵发性房颤疗效观察

刘新存 刘忠玉

(山东省鱼台县人民医院 鱼台 272300)

关键词:阵发性房颤;步长稳心颗粒;中西医结合疗法

中图分类号:R 541.7+5

文献标识码:B

文献编号:1671-4040(2004)02-0050-02

阵发性心房纤颤是常见的心律失常之一。许多研究表明它能使患者发生栓塞性疾病,能引起血流动力学障碍导致心力衰竭发生或加重。本研究主要观察步长稳心颗粒治疗阵发性房颤并与胺碘酮的疗效比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所有病人均为本院门诊及住院病人。均属房颤反复发作,每年 5 次以上,伴有明显血流动力学改变。如下列情况除外,窦性心动过缓、甲亢、肥厚梗阻性心肌病、严重肝肾功能不全及药物过敏者。符合条件者共 68 例,男 46 例,女 22 例;平均年龄 58.4 岁;原发疾病冠心病 48 例,高血压病 12 例,风心病 8 例。随机分为治疗组(步长稳心颗粒组)和对照组(胺碘酮组)各 34 例。2 组在性别、年龄、病程及病情方面的差异无显著性。

1.2 2 组均以治疗原发病和抗凝等常规治疗为基础治疗。治疗组加用步长稳心颗粒口服,1 次 1 袋,3 次/d,4 周为 1 个疗程;对照组以胺碘酮 200mg 口服,3 次/d,持续 7d 后改为 200mg 维持。治疗开始前常规做心电图、摄 X 线胸片、查肝功以及甲状腺功能。3 个月后复查并根据患者的反应和复查结果适当调整剂量。

1.3 疗效标准 心房颤动每年发作 1 次为显效,偶有短阵发作不伴明显临床症状或血流动力学改变能自行终止为有效,用药前后发作次数无明显变化为无效。2 组总有效率的比较,采用 χ^2 检验。

2 结果

本组病例平均用药时间为(24依)月,治疗组显效、有效、无效、总有效率分别为 19、9、6 例,82.3%;对照组分别为 21、6、7 例,79.4%。2 组总有效率相比无显著性差异($\chi^2=0.096, P > 0.05$)。治疗随访期间,治疗组有轻度头晕。对照组 4 例出现心动过缓(<50 次/min,加用心宝丸后改善,1 例出现明显 Q-T 延长,3 例终止胺碘酮治疗),6 例出现消化道症状,1 例出现甲状腺功能减退(停药后恢复),无肺纤维化、视力障碍、扭转室速等。

3 讨论

阵发性房颤是常见的心律失常之一。房颤复律后维持治疗是临床治疗的关键。胺碘酮属于 III 类抗心律失常药物,治疗房颤的机制是由于能延长心房不应期,抑制房早的作用,增加房室结有效不应期。近年国外应用小剂量胺碘酮治疗心力衰竭的临床试验表明,胺碘酮能抑制心律降低病死率^[1]。但

双花解毒汤合季德胜蛇药片治疗隐翅虫皮炎 12 例

彭国英

(湖南省溆浦县龙潭国英诊所 溆浦 419315)

关键词:隐翅虫皮炎;双花解毒汤;季德胜蛇药片

中图分类号:R 632

文献标识码:B

文献编号:1671-4040(2004)02-0050-01

12 例病人,其中男性 8 例,女性 4 例;年龄 15~45 岁;皮疹在颈肩部 8 例,躯干部 4 例,均有线片状水肿性红斑,其中 4 例伴有密集的丘疹,8 例伴有脓疱并出现糜烂面,自觉灼热痒痛。

治法和结果:均内服自拟双花解毒汤:金银花(异名双花)15g,连翘 10g,六一散 10g,地肤子 10g,草河车 10g,生地 30g,土茯苓 30g,甘草 10g,赤芍 10g,蜈蚣 2 条,蝉蜕 6g,黄芪 15g。每日 1 剂,煎汁 300mL,分 3 次服。并用季德胜蛇药片适量浸入 20mL 生理盐水中,溶后外搽,1d 3~6 次。3~5d,全部

治愈,皮疹消退,无任何自觉症状。

体会:隐翅虫皮炎是由于接触虫毒而引起的湿热毒疹。治宜清热解毒除湿,止痛消肿。方中金银花、连翘、草河车、甘草、蜈蚣清热解毒,六一散,土茯苓、地肤子利湿解毒,生地、赤芍凉血消肿,黄芪托毒外出,蝉蜕清热止痒;季德胜蛇药片由七叶一枝花、半枝莲、蜈蚣等组成,具有解毒清热、止痛消肿的功效。内服外用,共奏奇功。

(收稿日期:2003-10-05)