

金钱草片治疗尿路结石疗效观察

赵学勇 杨振花
(山东省平原县中医院 平原 253103)

关键词: 尿路结石; 金钱草片; 中医药疗法; 疗效观察
中图分类号: R 69 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0044-01

我院应用金钱草片治疗尿路结石 20 例, 收效满意。兹报告如下:

1 临床资料

20 例中男 12 例, 女 8 例; 年龄 21~60 岁, 平均 38 岁; 病程 2h~20d, 平均 10d; 全部病例均为肾绞痛发作就诊, 经 B 超或 X 线腹部平片、腹部 CT 确诊, 结石均在 1.5cm 以下, 其中肾结石 5 枚, 输尿管结石 12 枚, 膀胱结石 3 枚。

2 治疗方法

应用金钱草片(江西博士达药业有限责任公司生产, 0.3g/片) 每次 8 片, 首剂 12 片, 每日 3 次, 10 d 为 1 个疗程。疼痛发作时即用解痉止痛药, 如 654-2、强痛定、杜冷丁等; 伴发热, 血象升高有感染者, 即抗感染治疗; 治疗期间多饮水, 多跳跃及叩击腰肾区, 2 个疗程评定效果。

3 疗效观察

痊愈(症状、体征消失, 尿中结石排出, B 超或 X 线平片检查结石消失) 14 例, 显效(症状、体征减轻, B 超或 X 线平片结石减少或向下移动) 4 例, 无效 2 例, 总有效率 90.0%。

4 典型病例

患者, 男, 25 岁, 2003 年 5 月 15 日因突发右侧

腰痛 6h 来院就诊。体查: 体温 36.8℃, 痛苦面容, 强迫体位, 心肺正常, 腹平软, 肝脾未及, 右中腹部轻压痛。B 超示: 右输尿管上段见一 1.1cm×0.7cm 强光团, 为右肾积水(轻度)。尿常规: 红细胞 +++。诊断为右输尿管结石伴右肾积水。予 654-2 20mg+5%GS 250mL 静点, 肌注强痛定 1 支, 1h 疼痛缓解后加金钱草片口服, 每次 8 片, 首剂 12 片, 每日 3 次。5 月 22 日 B 超复查右输尿管结石消失, 自诉 5 月 21 日下午 3 点排小便时, 排出黄豆大结石 1 粒。经追踪半年无复发。

5 讨论

尿路结石是泌尿外科常见病, 现多采用激光、内窥镜、体外震波等先进技术碎石; 农村贫困地区因经济条件等种种原因限制了应用高新技术的机会。金钱草为传统排石之良药, 主要表现在 3 个方面: (1) 使碱性尿液酸性化, 并起到溶石的作用; (2) 松弛、扩张膀胱、输尿管平滑肌, 利于结石排出; (3) 显著利尿效应, 增加肾盂、输尿管内压, 起到推石下移的作用。金钱草研制为片剂, 用药及时、方便, 疗效可靠, 无毒副作用出现。

(收稿日期: 2004 - 01 - 05)

金纳多联合甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变 36 例临床观察

曹海平 李冉 郭景红
(山东省济宁市中区人民医院 济宁 272105)

关键词: 糖尿病周围神经病变; 中西医结合疗法; 金纳多; 甲钴胺; 胰岛素; 银杏黄酮甙
中图分类号: R 587.2 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0044-02

糖尿病周围神经病变是糖尿病常见的慢性并发症, 目前治疗方法很多, 但疗效不太理想, 我科于 2003 年以来应用金纳多针剂联合甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变 36 例, 收到满意效果。报道如下:

1 临床资料

1.1 病例选择 本组病例均为住院患者, 36 例中, 男 21 例, 女 15 例; 年龄 48~67 岁, 平均 56 岁; 病程均在 5 年以上, 患者除糖尿病症状外, 均有不同

程度的肢体麻木、疼痛和感觉障碍, 其中 11 例伴明显的末梢循环障碍, 7 例伴泌汗异常、胃肠功能紊乱等植物神经受损症状, 全部病例经神经电生理检查显示正中神经、胫神经的运动传导速度和感觉神经传导速度均减慢。另外, 按本组标准选择同期住院患者 28 例作对照组, 2 组的年龄、病情、病程等方面大致相同, 具可比性。

1.2 治疗方法 治疗组用金纳多 20mL 加生理盐