

安汝经治疗产后子宫复旧不全 86 例

徐秀荣 王新华
(山东省曹县人民医院 曹县 274400)

关键词:子宫复旧不全;安汝经;中医药疗法;益母草;当归;川芎
中图分类号:R 714.63 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0052-01

1 病例选择

(1) 妇科检查子宫大而软(与正常产后子宫大小相比),有不同程度压痛,双附件正常。(2) 全面检查排除尿潴留,排除血液病及其它内科病。(3) 查血常规均有不同程度的贫血。(4) B 超检查子宫体积增大,无子宫肌瘤及子宫肌腺瘤。

2 治疗方法

如 B 超检查有胎盘或胎膜残留者,先行清宫术,然后以安汝经(江西博士达药业有限责任公司生产)治疗,8 片,每日 2 次;阴道流血减少后改为每次 5 片,每日 2 次。10d 为 1 个疗程。贫血重者同时应用抗贫血药物,腹痛明显且恶露有臭味者同时应用抗生素,重者静脉用药,轻者口服安汝经。

3 疗效观察

1 个疗程治愈(阴道流血停止,白带不多,腹痛消失,贫血好转) 63 例,显效(阴道流血减少或白带中混有血液,腹痛减轻,贫血好转) 23 例;2 个疗程治愈 23 例,治愈率 100%。治疗期间无胃肠道刺激

等不良反应。

4 讨论

安汝经是由益母草、川芎、当归 3 味中药加工而成。方中益母草入心、肝两经血分,活血化瘀,使瘀血去而新血生,研究发现含生物碱益母草素甲、乙、丙等,对子宫有兴奋作用,对常见真菌有不同程度的抑制作用,故可用于产后虚弱、宫缩无力及抵抗力下降而致的真菌感染;川芎活血行气,对子宫收缩及舒张有调节之功效,并有镇痛、镇静功能;当归养血活血,使活血而不伤血。研究发现当归含有兴奋和抑制子宫肌的两种成份,故可调节子宫收缩情况;当归含有维生素 B₁₂ 及叶酸等有抗贫血作用,故较适于贫血患者。三药配伍应用,相辅相成,共奏行气活血、祛瘀生新、补血之功效,较适于产后子宫复旧不全、产后体虚、贫血的治疗,有利于产后身体康复。重者同时应用抗生素,中西药结合治疗,可缩短疗程,增强治疗效果。

(收稿日期: 2004 - 01 - 12)

肤痒颗粒与复方青黛丸治疗玫瑰糠疹 36 例

杨广平¹ 张庆梅²
(1 山东省聊城市中医院 聊城 252000; 2 山东省聊城市国际和平医院 聊城 252000)

关键词:玫瑰糠疹;肤痒颗粒;复方青黛丸;中医药疗法
中图分类号:R 758.64 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0052-02

笔者采用肤痒颗粒联合复方青黛丸,治疗玫瑰糠疹疗效满意。现报道如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 62 例均为我科门诊病例,女 27 例,男 35 例;年龄 16~40 岁,平均 28 岁;病期 1~6 周;38 例曾服用过维生素类药、抗过敏药及外用药物,慢性迁延性玫瑰糠疹 6 例,炎症性玫瑰糠疹 3 例,周身性玫瑰糠疹 2 例。
1.2 临床表现 多在躯干处出现玫瑰红色斑块,覆有少量糠状皮屑,边界清楚,中央呈皱纹纸样,散在

分布,多不融合,伴有轻微瘙痒;泛发者头面部、四肢、躯干皆可出现;较甚者皮损中出现小水疱、脓疱、颈腋窝淋巴结肿大,迁延性患者病程超过 4 周,症状时轻时重。

2 治疗方法

治疗组:口服肤痒颗粒(江西博士达药业有限责任公司生产) 9g~18g/ 次,每日 3 次;复方青黛丸 6g/ 次,每日 3 次,1 周为 1 个疗程。对照组用复方青黛丸每次 6g,每日 3 次,1 周为 1 个疗程。2 组患者均禁食辛辣刺激性食物。

龙胆泻肝汤配合刺络拔罐法治疗带状疱疹 46 例

尹剑平

(江西省九江化工厂职工医院 九江 332000)

关键词:带状疱疹;中医药疗法;龙胆泻肝汤;刺络拔罐法;梅花针疗法

中图分类号:R752.1+2

文献标识码:B

文献编号:1671-4040(2004)03-0053-02

自 1989 年 2 月~2003 年 6 月,运用龙胆泻肝汤加减配合刺络拔罐法治疗本病 46 例,取得了较为满意的疗效。现报道如下:

1 一般资料

46 例患者中,男 32 例,女 14 例;年龄 11~56 岁;病程最短者 2d,最长者 26d;病损在胸背部 32 例,腰腹部 14 例;12 例经过西医治疗。所有患者出现过集簇性丘疹、水疱,疼痛明显,部分患者低热,乏力,局部皮肤感觉过敏。

2 治疗方法

46 例均内服龙胆泻肝汤加减治疗。方药组成:龙胆草 10g,柴胡 6g,泽泻 10g,车前子 10g,木通 9g,生地黄 10g,当归 9g,黄芩 9g,栀子 9g,甘草 3g。疼痛较甚者,加川楝子、青木香;肿胀明显者,加金钱草、白僵蚕、蒲公英;大便干结者,加大黄。日 1 剂,水煎 2 次,分服,7d 为 1 个疗程。病损部位配合刺络拔罐法治疗:沿皮损周围用 75%酒精消毒皮肤,操作时用右手持梅花针针柄,进行均匀、有力的弹扣,先轻后重,直至局部皮肤潮红或微量出血为止,立即在针刺部位拔罐,留罐 3~5 min,待病损部位向外凸起,罐中出现少许紫黑色血液或黄稠液体时即可起罐,术后用消毒药棉擦净患处即可。视病

情,1d 或隔日 1 次,7d 为 1 个疗程。

3 治疗结果

痊愈(1~3 周皮疹全部消退,疼痛消失)43 例,有效(3 周后皮疹部分消退,疼痛减轻)2 例,无效(3 周后皮疹不能控制,疼痛依旧)1 例,总有效率 97.8%,无复发病例。

4 典型病例

李某,男,32 岁。初起觉右侧胸背部微痒刺痛,继则出现几处集簇性丘疹、水疱,水疱中可见少许脓液,疼痛明显,尤夜间加剧,低热,口苦,心烦,大便偏干。予以龙胆泻肝汤加减治疗。方药组成:龙胆草 10g,柴胡 6g,泽泻 10g,车前子 10g,木通 9g,生地黄 10g,当归 9g,黄芩 9g,栀子 9g,川楝子 6g,大黄 9g。水煎服,日 1 剂。皮损周围用刺络拔罐法治疗,每日 1 次。治疗 1 周后,诸症消失。随访 1 年未复发。

5 体会

带状疱疹系由带状疱疹病毒引起。本病毒具有亲神经性,可长期潜伏在神经节的神经元内,当宿主免疫力降低时发病。尤其是中老年患者,皮疹愈合后,可遗留神经痛数月。西医主要采取抗病毒、激素及对症治疗。中医认为系火邪湿毒凝结而成,治

3 疗效观察

治疗 1~3 周,治疗组 36 例,治愈(斑块消退,无新斑疹,瘙痒不明显,皮屑消退,皮肤色泽恢复正常)30 例,显效(斑块明显减少,色变淡,痒轻,无新起)3 例,有效(斑块色变浅,有消退倾向,时有新发斑疹,轻微瘙痒)3 例,治愈率 83.3%,总有效率 100%。治疗最短时间 8d,最长时间 20d,平均 14d。对照组 26 例,治愈 18 例,显效 3 例,有效 2 例,无效 3 例,治愈率 69.2%,总有效率 88.5%。

4 体会

玫瑰糠疹是一种自限性炎症皮肤病,以椭圆形玫瑰色斑块,覆有糠状鳞屑,好发于躯干近端为特征,但易形成慢性迁延性,缠绵难愈。病因病机为外

感风热之邪,闭塞腠理,内因热伤阴液,血热化燥,外泛皮肤所致。肤痒颗粒是针对病因病机而制成的中成药,由苍耳子(炒、去刺)、地肤子、川芎、红花、白英等药物组成,具有祛风活血、除湿止痒之功效。现代药理研究表明本品具有抗炎、抗病毒、抗皮肤真菌、止痒、活血作用,配合具有清热解毒、化瘀消斑、祛风止痒的复方青黛丸,疗效更佳。笔者在临床应用中发现本品除了用于治疗荨麻疹、皮肤瘙痒症、玫瑰糖疹外,还能用于治疗体癣、股癣等真菌感染性皮肤病,及寻常型银屑病,并且服用方便,无毒副作用,值得推广。

(收稿日期:2004-01-05)