阻中焦型可见食欲较差,胃脘不适,口渴不喜饮,身重胸闷,舌苔黄白相兼而厚,脉濡细;方用三仁汤:杏仁 6g、蔻仁 6g、苡仁 15g、厚朴 6g、通草 6g、滑石 12g、制半夏 6g、竹叶 6g。

中医认为:脾为后天之本,主运化,脾统血,脾胃为生发之源。故对脾胃虚弱型,以补气健脾为主,使中焦健运,正气充盛;方用四君子汤。党参补气,白术、茯苓、苡仁、淮山补脾益气,鸡内金、炒谷芽健脾和胃助消化,甘草调和诸药,从而达到补气健脾作用。肝胃不和型,肝主疏泄,喜条达,胃气受纳,胃以降为顺,用疏肝理气之药,方用四逆散加减。柴胡疏肝理气,枳壳理气消胀,郁金、合欢皮、川楝子行气解郁,茯苓健脾,白芍、甘草缓急止痛。肝气得疏,胃运正常。湿阻中焦用三仁汤,这是用湿邪留气分、湿胜热郁之方。用苦温肃肺的杏仁宣降肺气,用芳香苦辛的蔻仁宣畅中焦,用甘温渗湿的苡仁、滑石、竹叶、通草通导下焦,用半夏、厚朴化湿降逆。上药合用,宣化畅中,清利湿热,诸症自解。若伴呕吐者可在上述分型中酌加陈皮、竹茹、制半夏、生姜等药降逆止呕。

3 血象下降

血象下降是妇癌化疗副反应之一,主要表现在周围血象中的白血球减少。临床上出现头昏、乏力、纳欠佳、口干、腰疼痛等症状、舌质淡、苔薄、脉细弱。中医辨证属气血两虚,采用补气养血法。自拟方:党参 20g,黄芪 15g,当归 10g,鸡血藤 12g,枸杞 12g,制首乌 12g,白术 10g,茯苓 10g,苡仁 15g,女贞子 12g,杜仲 10g、甘草 6g。加减:身上出现紫斑加仙鹤草 15g、旱莲草 12g、丹皮 10g、赤芍 10g,食欲差加淮山 12g、鸡内金 6g、炒谷芽 10g。

根据临床表现属中医学的虚劳范畴,脾胃为后天之本,气血生化之源。饮食水谷入胃,经过脾胃的共同消化吸收作

用,化生气血以营养五脏六腑、四肢百骸,所谓中焦受气取汁,变化而赤是谓血;故血液的生成和运化与脾关系最为密切。《普济方》曰:“人之一身,不离乎气血。”故采用党参、黄芪、白术、茯苓、苡仁健脾益气,当归、鸡血藤、枸杞、制首乌养血活血,女贞子、杜仲补肾益髓,甘草调和诸药。全方共奏健脾益气、养血活血之攻。

4 肝功能损伤

妇癌化疗后复查肝功能出现肝功能不正常,临床上多表现两肋下胀痛不适、纳差、恶心厌油腻、口干、乏力等症状,舌苔淡黄或腻,脉细或细弦。根据临床表现认为:毒伤正气,肝郁脾虚(弱)是妇癌化疗所致肝功能损伤的基本病机,用疏肝理气、健脾和胃,佐以解毒利湿的基本治疗原则,采用逍遥散加减治疗。用药:当归 10g、白芍 10g、柴胡 6g、茯苓 10g、白术 10g、苡仁 15g、鸡内金 6g、炒谷芽 10g、淮山 12g、茵陈 15g、蒲公英 15g、生甘草 6g。加减:出现口干口苦加丹皮 10g、栀子 6g,手足心发热加二至、生地 10g,大便秘结加生大黄 10g,肋下胀痛加郁金 10g、川楝子 6g。化疗后肝功能损伤,采用柴胡疏肝解郁理气;当归、白芍养血调肝;白术、茯苓、淮山、鸡内金、炒谷芽健脾益气,助胃消化;苡仁、茵陈、蒲公英清热解毒,健脾利湿;使肝气调畅,脾得健运,清热解毒利湿,便诸症得减,肝功能恢复正常。

5 肾功能损伤

妇癌化疗常用 DDP、IFD、MTX 等药治疗,西医多采用水化的方法帮助肾脏排毒,但反复的化疗使肾功能损伤,出现肌酐、尿素氮的升高,出现腰疼痛、乏力、食纳不振、口干、尿短少、舌淡、苔白等症状。辨证为:正气受损,肾脾两虚(先天、后天同损),以补肾健脾、利尿排毒为治(下转第 87 页)

丹参注射液治疗过敏性紫癜疗效观察

孙洪丽

(山东省文登市第一人民医院 文登 264400)

关键词:过敏性紫癜;中西医结合疗法;丹参注射液;疗效观察

中图分类号:R 593.1

文献标识码:B

文献编号:1671-4040(2005)06-0065-01

过敏性紫癜属过敏性血管炎范围,是学龄期儿童多发病之一。本文应用丹参注射液治疗取得较好效果。报告如下:

1 对象与方法

1.1 对象 62 例患儿均符合第 6 版《诸福堂实用儿科学》诊断标准^[1],按入院顺序随机分为观察组 32 例和对照组 30 例。年龄 1 岁~13 岁,平均 7.8 岁,以学龄儿童为主。观察组男 20 例,女 12 例;对照组男 16 例,女 14 例。2 组间的性别、年龄、病程及临床分型均无显著性差异($P>0.05$),具有可比性。

1.2 治疗方法 对照组给予抗感染口服维生素 C、复方芦丁、抗组织胺剂等综合治疗;治疗组在此基础上加用复方丹参注射液(上海中西医药业生产)1~2mL/kg,加入 5%~10%葡萄糖 10 倍稀释液中静脉输注,1 次/d,疗程 10~14d。

2 疗效观察

经治疗 2 周内皮疹消退,无新皮疹为有效;治疗 2 周皮疹未见明显消退为无效。结果治疗组有效 29 例,总有效率 90.62%;对照组有效 20 例,总有效率 66.67%;2 组比较有极显著性差异($\chi^2=4.59, P<0.05$)。治疗中未见明显不良反应。

3 讨论

过敏性紫癜是儿童常见的血管变态反应性疾病,以广泛的小血管炎症为病理基础,以皮肤紫癜、消化道出血、关节肿胀和肾炎等症状为主要临床表现。丹参注射液主要药理作用为^[2]:抑制血小板过度激活,减少血小板聚集,降低血浆黏度和全血黏度抑制血栓形成;具有改善微循环扩张微血管的作用;具有消除氧自由基、提高抗氧化酶活性的作用;具有阻止 Ca^{2+} 内流的作用,减轻对肾毛细血管壁的损伤。上述结果提示,丹参注射液可显著改善过敏性紫癜的症状,促使皮疹消退,可减少应用激素引起的诸如皮疹复发、紫癜肾等副作用及激素本身的副作用,值得临床推广使用。

参考文献

[1]吴瑞萍,胡亚美,江载芳.诸福堂实用儿科学[M].北京:人民卫生出版社,1996.676

[2]陈维洲.丹参的药理[J].药学报.1984,19(11):876~878

(收稿日期:2005-05-17)