

宫颈涂片早期防癌的临床探讨

蔡艳平 郑鸿鸽
(江西凤凰医院 上饶 334000)

关键词: 子宫颈癌; 宫颈涂片; 临床探讨
中图分类号: R 737.33 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2006)05-0050-01

子宫颈癌在我国女性生殖器官恶性肿瘤居首位,也是女性各种恶性肿瘤中最常见的。由于它是由宫颈糜烂癌前病变逐渐发展而来的,因而宫颈涂片能及时发现宫颈癌前病变和原位癌,亦是一项保障广大妇女健康、早期发现、早期诊断、早期治疗的重要措施。现将我院 3 年来的 1000 多例防癌涂片报告如下:

1 资料与方法

- 1.1 检查对象 自 2003~2005 年在我院妇科普查的已婚妇女 1 680 例,年龄最小的 19 岁,最大的 75 岁。
- 1.2 检查方法 取被检者阴道、宫颈、后穹隆脱落细胞涂片,先以 95% 的酒精固定 5~7min,后以巴氏染色法制片,普通显微镜检查。
- 1.3 诊断标准 按宫颈涂片分类法将病变分为 5 级,分 A、B 两型。A 型: I 级为基本正常; II 级有异常细胞,但属良性范围。B 型: III 级有可疑恶性细胞; IV 级有高度可疑恶性细胞; V 级有癌细胞。

2 结果

- 2.1 宫颈炎与病变的关系 轻度糜烂 398 例中: I 级 358 例, II 级 39 例, III 级 1 例, IV 级 0 例, V 级 0 例; 中度糜烂 814 例中: I 级 435 例, II 级 358 例, III 级 10 例, IV 级 8 例, V 级 3 例; 重度糜烂 468 例中: I 级 5 例, II 级 426 例, III 级 18 例, IV 级 8 例, V 级 11 例。

- 2.2 胎次与病变关系 1 胎中: I 级 602 例, II 级 32 例, III 级 0 例, IV 级 0 例, V 级 0 例; 2 胎中: I 级 190 例, II 级 65 例, III 级 3 例, IV 级 0 例, V 级 0 例; 3 胎中: I 级 6 例, II 级 332 例, III 级 6 例, IV 级 4 例, V 级 1 例; 4 胎中: I 级 0 例, II 级 352 例, III 级 9 例, IV 级 6 例, V 级 6 例; 4 胎以上中: I 级 0 例, II 级 42 例, III 级 11 例, IV 级 6 例, V 级 7 例。

3 讨论

子宫颈阴道部为复层鳞状上皮覆盖,以及正常的阴道酸碱度自御,它对炎症抵抗力较强,如果某一环节被破坏,那么就会产生病变。(1)当宫颈被分娩、流产(特别是多次分娩、流产)的机械性刺激损伤后,造成较深的宫颈裂口或多数小裂口,这些小裂口当时并不引起任何临床症状,但却是细菌进入深层组织或淋巴管的通路,以致日后引起宫颈病变。(2)当频繁的性交刺激宫颈后,尤其是不洁的性生活,包皮垢、避孕工具等,使其上皮细胞脱落时,细菌易乘机侵入而引起感染。(3)当阴道酸碱度发生变化时,自身抵抗力低下,以致异常的细菌丛繁殖,阴道分泌物增多,呈脓性或浆液性,使子宫长期浸泡在分泌物中,使鳞状上皮细胞脱落产生病变。

宫颈涂片检查虽然就目前来说是落后了一些,但对于基层医院来讲,还是一种简单可行的诊断方法。

(收稿日期: 2006-03-20)

口服加灌肠治疗溃疡性结肠炎

吴海燕¹ 卜凡涛²
(1 山东省鱼台县妇幼保健院 鱼台 272300; 2 山东省鱼台二院 鱼台 272344)

关键词: 溃疡性结肠炎; 灌肠; 中西医结合疗法; 黄连素片; 补脾益凤丸; 思密达; 锡类散
中图分类号: R 574.62 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2006)05-0050-01

溃疡性结肠炎,又称非特异性结肠炎,是一种病因不明的直肠和结肠炎性病变,临床主要表现为腹泻、黏液脓血便、腹痛和里急后重。病情轻重不等,多呈反复发作的慢性病程,无特效治疗方法。我们自 2002 年 7 月~2005 年 10 月用口服黄连素片、补脾益肠丸,思密达加锡类散保留灌肠治疗结肠炎 46 例,取得较满意效果。现报道如下:

1 临床资料

- 1.1 病例选择 全部病例均有临床症状、体征,经纤维结肠镜检查获得明确诊断,46 例均经传统药物治疗,但疗效欠佳或仍有复发者。其中男 22 例,女 24 例;年龄 21~48 岁,平均 36.5 岁;病程最短 4 个月,最长 6 年。
- 1.2 治疗方法 口服黄连素片,每天 3 次,每次 3 片;补脾益肠丸,每天 3 次,每次 6g;思密达 1 包、锡类散 1.5g 加生理盐

水 100mL 保留灌肠,每天 1 次,灌肠 30min 内根据病变部位采用左侧、右侧、平卧和臀部高位等体位,同时嘱病人用双手压迫肠段病变部位安静休息,一般 1~2h 后可随意活动。用药 15d 为 1 个疗程,隔 7~10d 进行第 2 个疗程。

- 1.3 疗效判断 经治疗 2~3 个疗程后作疗效判断。痊愈:临床症状消失,经结肠镜检查炎症消除,1 年内随诊未复发。好转:临床症状减轻或结肠镜检查炎症明显好转。无效:经 3 个疗程治疗,临床症状未减轻或结肠镜检查炎症未改变。

- 1.4 结果 痊愈 26 例(占 56.5%),好转 16 例(占 34.8%),无效 4 例(占 8.7%),总有效率 91.3%。

2 讨论

黄连素片为中药黄连制成,口服肠道不易吸收,主要杀死痢疾杆菌、大肠杆菌;补脾益肠丸是一种中(下转 第 80 页)