

# 苦参地榆槐角汤配合西药治疗慢性肛窦炎 60 例

刘子会<sup>1</sup> 黄振乾<sup>2</sup>

(1 山东省莱芜市中医医院 莱芜 271100; 2 山东省莱芜市钢城区颜庄医院 莱芜 271100)

**关键词:**慢性肛窦炎;苦参地榆槐角汤;中西医结合疗法;抗生素;洗必素栓

**中图分类号:**R 574.8

**文献标识码:**B

**文献编号:**1671-4040(2008)06-0055-01

我院于 2002 年 6 月~2006 年 6 月共收治慢性肛窦炎 101 例,其中 60 例采用自拟苦参地榆槐角汤配合西药常规治疗,41 例单纯西药常规治疗。现比较如下:

## 1 临床资料

1.1 一般资料 本组 101 例随机分为两组。试验组 60 例,男 35 例,女 25 例;年龄 19~65 岁,其中 40~55 岁 34 例(占 57%);病程 1~15 年,其中 3~6 年 39 例(占 65%)。对照组 41 例,男 23 例,女 18 例;年龄 20~63 岁,其中 36~53 岁 23 例(占 56%);病程 1~15 年,其中 3~5 年 25 例(占 61%)。两组患者的性别、年龄、病程经统计学处理无显著差异,具有可比性。

1.2 诊断标准 对照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》相关疾病<sup>[1]</sup>以及《中国肛肠病学》肛窦炎<sup>[2]</sup>诊断标准,确定如下:(1)以往排大便时肛管灼热刺痛,大便中有脓性分泌物或脓血;(2)现症状为排大便后肛门有短暂时间的微痛或不适,肛门下坠;(3)指诊肛窦硬肿,中间凹陷窝加深,肛瓣隆起,明显触痛,肛镜检查肛窦、肛瓣红、充血、水肿,轻按肛窦有脓水流出。

## 1.3 治疗方法

1.3.1 试验组 中药治疗:苦参地榆槐角汤,药用苦参 20g,地榆 20g,槐角 20g,黄芩 10g,黄柏 10g,金银花 20g,当归 10g,赤芍 10g,生地 10g,土茯苓 20g,赤小豆 30g,甘草 6g。每日 2 剂,其中 1 剂水煎分 2 次口服,连服 3 周为 1 个疗程;另 1 剂水煎后熏洗坐浴,每日 2 次。西药治疗:常选用抗生素及外用栓剂,抗生素用甲硝唑 250mL(含 0.5g)、头孢曲松 2.0g、氧氟沙星 0.4g,配入 10%GS 中静滴;外用栓剂用洗必泰栓,每日 2 次,每次 1 枚。3 周为 1 个疗程,2 个疗程后观察疗效。

1.3.2 对照组 选用抗生素及外用栓剂,药物及疗程同试验组。

## 2 疗效观察

2.1 疗效标准 参照文献<sup>[1-2]</sup>的评定标准。治愈:症状消失,专科检查均正常;好转:症状明显减轻,肛门指诊肛窦仍有小硬结,触之有轻度疼痛,肛镜下见局部正常;无效:症状稍减轻,但专科检查结果均同疗前。

2.2 治疗结果 试验组治愈率为 91.67%,有效率为 96.67%,对照组分别为 48.78%、73.17%,两组疗效比较,经统计学处理有显著性差异,P 值均 <0.01,试验组明显优于对照组。

表 1 两组临床疗效比较 例

| 组别  | n  | 治愈 | 好转 | 无效 |
|-----|----|----|----|----|
| 试验组 | 60 | 55 | 3  | 2  |
| 对照组 | 41 | 20 | 10 | 11 |

## 3 讨论

肛窦炎是在肛窦、肛门瓣产生的急慢性炎症,是肛门口常见的一种疾病,给患者带来肛门口刺痛、潮湿、瘙痒、黏液血便、肛门下坠等不适,特别是慢性肛窦炎,由于反复发作,迁延不愈,会给患者带来一定的精神负担。中医学认为,本病主要是因湿热下注导致肛门局部气血瘀滞所致,笔者采用自拟苦参地榆槐角汤,就是针对湿热下注导致的慢性肛窦炎而设,方中苦参、黄芩、黄柏清热利湿;金银花清热解毒;地榆、槐角、赤芍、生地、当归清热凉血、活血止痛;土茯苓、赤小豆利水消肿、润肠通便;甘草调和诸药。另外,在用中药口服、熏洗坐浴的同时,配合有效的抗生素静滴和外用栓剂,应尽量避免使用肾毒性大的抗生素,疗程不能太短,通常不少于 3 周。中西医结合治疗慢性肛窦炎标本兼顾,提高了治愈率,减少了复发。

## 参考文献

- [1]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.132-133
- [2]黄乃健.中国肛肠病学[M].济南:山东科学技术出版社,1996.790-793

(收稿日期:2008-05-23)

# 中西医结合治疗乳腺囊性增生病 44 例疗效观察

周荣伟

(南昌大学第四附属医院 江西南昌 330003)

**关键词:**乳腺囊性增生;中西医结合疗法;平消胶囊;逍遥丸;他莫昔芬

**中图分类号:**R 655.8

**文献标识码:**B

**文献编号:**1671-4040(2008)06-0055-02

乳腺囊性增生病也称慢性囊性乳腺病(简称乳腺病),是妇女多发病,常见于中年妇女<sup>[1]</sup>。自 2001 年以来,我院采用平消胶囊、逍遥丸合用他莫昔芬治疗该病 44 例,疗效满意,并与单纯口服他莫昔芬治疗的 40 例对比。现报道如下:

## 1 临床资料

1.1 一般资料 84 例患者均为已婚女性,随机分为两组。A

组为中西医结合治疗组(44 例),采用平消胶囊、逍遥丸合用他莫昔芬治疗;B 组为对照组(40 例),采用他莫昔芬治疗。年龄 23~53 岁,平均 36 岁,病程最短 3 个月,最长 12 年。两组一般资料具可比性。

1.2 诊断标准 (1)患者均有乳房胀痛和肿块,呈周期性,与月经有关,月经前疼痛加重。乳腺肿块可局限于乳腺的一部