

62 例克林霉素不良反应的分析

张璐¹ 梁燕²

(1 贵州省纳雍县人民医院 纳雍 553300; 2 贵州省纳雍县中医院 纳雍 553300)

关键词: 克林霉素; 不良反应; 防治措施

中图分类号: R 969.3

文献标识码: B

doi: 10.3969/j.issn.1671-4040.2013.02.056

克林霉素又称氯洁霉素, 为林可霉素的衍生物, 作用机制主要为抑制细菌蛋白质合成^[1], 对革兰阳性球菌和厌氧菌有较强的抗菌活性。本文回顾性分析我院 2000 年 1 月~2009 年 6 月间 62 例使用克林霉素发生不良反应的资料, 为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 我院 2000 年 1 月~2009 年 6 月间使用克林霉素的患者 2 470 例, 其中 62 例发生不良反应, 占 2.51%, 男 29 例, 女 33 例, 年龄 8 个月~72 岁, 平均 45.65 岁。用于治疗泌尿系统疾病 20 例, 消化系统疾病 16 例, 内分泌系统疾病 9 例, 妇科疾病 6 例, 神经系统疾病 6 例, 心血管系统疾病 5 例。

1.2 方法 对 62 例患者的性别、年龄、给药途径和不良反应等临床资料进行统计、分析。

2 结果

2.1 不良反应与性别、年龄的关系 男性 29 例, 占 46.77%, 女性 33 例, 占 53.22%; 发病年龄以 51~72 岁居多, 共 29 例, 占 46.77%。见表 1。

表 1 62 例克林霉素不良反应与性别、年龄分布的关系 例				
年龄(岁)	男性	女性	合计	比率(%)
8 个月~10	4	4	8	12.90
11~20	3	4	7	11.29
21~30	3	3	6	9.68
31~40	2	4	6	9.68
41~50	3	3	6	9.68
51~60	5	4	9	14.52
61~72	9	11	20	32.26
合计	29	33	62	100

2.2 不良反应与给药途径的关系 给药途径分 3 种: 静脉注射 41 例, 占 66.13%; 肌肉注射 13 例, 占

20.97%; 口服给药 8 例, 占 12.90%。

2.3 不良反应主要临床表现及分类情况 62 例药物不良反应涉及多个系统, 以皮肤过敏的各种皮疹居首位, 共 21 例, 占 33.87%; 消化系统其次, 共 15 例, 占 24.19%; 皮肤黏膜 13 例, 占 20.97%; 神经系统 9 例, 占 14.52%; 泌尿系统 4 例, 占 6.45%。

2.4 转归 62 例经对症治疗后, 均痊愈, 无 1 例发生生命危险。

3 讨论

克林霉素作为临床常用药物之一, 广泛应用。但由于其有很多不良反应, 使用时应严格注意: (1) 克林霉素不能作为临床首选药物, 应严格掌握适应证。(2) 用药前应详细询问患者药物过敏史, 尽量做药敏试验, 在用药中也需要密切观察患者的临床表现, 一旦发生异常应停止用药^[2]。对于有青霉素过敏史的患者在使用克林霉素时尤其应该密切观察。

综上所述, 年龄 51~72 岁老年人发生不良反应比率最高, 因此, 应加强个体化给药的意识, 根据老年人的生理、病理特点选用不良反应少的药物, 用药过程中应加强监护。针对个体差异、过敏史及现用药物情况等严格掌握适应证, 规范医疗行为, 坚持合理用药, 加强药物不良反应的监测与上报工作, 有效减少药物不良反应的发生, 保证临床用药安全有效, 减小不良反应给人们带来的危害。

参考文献

[1]张梅.克林霉素、庆大霉素、替硝唑联合应用治疗急性盆腔炎的疗效观察[J].中国医学创新,2011,8(12):72-73
[2]夏瑜.克林霉素的不良反应及其预防[J].抗感染药学,2006,3(4):187-189

(收稿日期: 2012-11-07)

了祖国医学标本兼治、双向调节的专长。而且中医治疗又降低了维 A 酸类药物干燥脱屑等阴虚燥热的弊病。

参考文献

[1]刘辅仁.实用皮肤科学[M].第 2 版.北京:人民卫生出版社,1996. 30-131
[2]蔡东华,林莹莹.中西医结合治疗顽固性扁平疣疗效观察[J].中国皮肤性病学杂志,2001,15(6):408-409

[3]靳培英.皮肤病药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2004.13
[4]杨国亮,王侠生.现代皮肤病学[M].上海:上海医科大学出版社, 1995.737
[5]宋宁静,杨风清,宋兆友.维胺脂类药物治疗囊肿性痤疮的疗效观察[J].临床皮肤科杂志,1997,26(5):341
[6]张信江,张合恩.实用皮肤性病治疗学[M].北京:人民军医出版社, 2003.186

(收稿日期: 2012-03-15)